

# Kegleoperation på livmoderhalsen

På grund af celleforandringer på livmoderhalsen fjernes et mindre kegleformet stykke (conus) af livmoderhalsen.



Det lille indgreb foretages med elektrisk slynge i lokalbedøvelse (og enkelte gange i fuld bedøvelse) og varer få minutter. Du bliver inden indgrebet tilbudt et par smertestillende tabletter.

Indgrebet foretages ambulant. Foretages indgrebet i lokalbedøvelse, er det ikke nødvendigt at være fastende, og man kan gå hjem efter 1/2 - 1 time med ledsager. Hvis indgrebet skal foretages i fuld bedøvelse, er det nødvendigt at møde fastende, og man kan gå hjem efter nogle timers forløb med ledsager.

Det fjernede område sendes altid til mikroskopisk undersøgelse.

## Råd og vejledning efter udskrivelsen

### Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem?

De fleste vil være i stand til at passe deres arbejde 1-2 dage efter kegleoperationen, men fysisk krævende arbejde, hård sport og tunge løft skal du vente en uges tid med.

Hvis du har brug for smertestillende, så kan du tage 1 g Pamol og 400 mg Ibumetin ved behov, dog max. hver 6 time.

3-5 uger efter kegleoperationen vil såret på livmoderhalsen være helet op og området, hvor keglen er fjernet, vil være dækket af ny slimhinde.

## Forholdsregler

Du kan have let blødning fra skeden i den første uge. Udflåd kan vare i op til 2-3 uger (kan være rigeligt og vandigt i starten). Du skal også være forberedt på, at der kan komme lidt frisk blødning efter 8-14 dage. Dette skyldes, at sårskorpen på livmoderhalsen falder af.

### **Så længe du bløder og har udflåd, så anbefaler vi, at du:**

- Undgår at bade i svømmehal og havet
- Undgår karbad. Du må gerne tage brusebad.
- Undgår samleje
- Undgår at bruge tampon

## Kontrol

Kontrolundersøgelse efter kegleoperation afhænger af om keglen er fjernet i sundt væv, hvilket vi naturligvis tilstræber. Svaret på om keglen er fjernet i sundt væv får du besked om ca. 1 uge efter keglesnit er foretaget.

Hvis keglen er fjernet i sundt væv, så skal du have tage en celleprøve og HPV-test fra livmoderhalsen efter 6 måneder hos din egen læge. Hvis den prøve er normal, så går du tilbage til screeningsprogrammet og får en invitation til celleprøve hos din egen læge efter 3 eller 5 år afhængig af din alder.

Hos nogle kvinder kan der være celleforandringer i kanten af den fjernede kegle. Oftest vil disse celleforandringer forsvinde, når såret heler op, men det er vigtigt at få det tjekket. Du vil derfor blive tilbudt en kontrol hos os efter 6 måneder, hvor der bliver taget en celleprøve og HPV-test fra livmoderhalsen. Du vil blive fulgt indtil celleprøve og HPV-test er normale, førend du kommer tilbage i screeningsprogrammet hos din egen læge.

## Hvis der opstår problemer

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der opstår problemer.

Hvis det bløder voldsomt, skal du kontakte Privathospitalet Mølholm eller vagtlægen.

Ligeledes skal du kontakte os, hvis du får tiltagende smerter eller hvis du får feber eller tegn på

betændelse.

Med venlig hilsen

**PRIVATHOSPITALET MØLHOLM**

Gynækologisk klinik