


Lukning af venstre forkammers hjerteøre (Aurikel)

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om behandlingen.


Behandlingen er for personalet en daglig rutine, som vi føler os trygge ved. Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryk og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

Personer med atrieflimren (forkammerflimren) har øget risiko for at få blodpropper i hjernen. 25% af alle blodpropper i hjernen skyldes blodpropper, der dannes i hjertet under atrieflimren, men som river sig løs og føres med blodbanen til hjernen. Langt de fleste blodpropper dannes i en lille "blindtarm" til det venstre forkammer - hjerteøret eller auriklet.



**Blodprop i venstre
forkammers hjerteøre
(aurikel)**

Normalt forebygges blodpropper hos personer med atrieflimren med "blodfortyndende" medicin marevan, eliquis, xarelto eller pradaxa. Nogle tåler imidlertid ikke medicinen eller har oplevet alvorlige blødningskomplikationer. Hvis dette er tilfældet, kan man lukke venstre forkammers hjerteøre med en lille "paraply", der føres ind i hjertet fra lysken. Lukningen betyder, at der ikke kan dannes klumper af størknet blod i hjerteøret - og dermed kan blodpropper undgås. Beskyttelsen mod blodpropper og hjerneblødning er ligeså god, som hvis man anvender blodfortyndende medicin.



Selve operationen foretages i fuld bedøvelse og udføres fra lysken.

Der anvendes en del teknisk udstyr så som røntgenapparat. Du kan læse mere om brugen af røntgen her: **Røntgenstråler**

Operationen tager under en time, og du vil kunne gå hjem igen den følgende dag. Komplikationer til indgrebet er sjældne (samlet set under 5%) og omfatter blodansamling i lysken ved indstikstedet, blødning til hjerteposen (tamponade, risiko mindre end 1%) og løsrivelse af "paraplyen" (risiko mindre end 0,5%). Disse komplikationer vil kunne håndteres, så der ikke opstår varige skader. Lukning af venstre forkammers hjerteøre kan overvejes som alternativ til blodfortyndende medicin - også selvom der ikke har været bivirkninger eller blødningskomplikationer.

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter