
Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen, skal du tage din medicin som vanligt.

Der er dog følgende undtagelser:

Acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Kodimagnyl®, Treo®)

Stoppes 3-5 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

OBS: Hvis du tidligere har haft blodprop, gennemgået ballonudvidelse eller fået indlagt stent i hjertet, gælder særlige regler, og du må kun stoppe med Acetylsalicylsyre, når det er aftalt med læge.

Andre typer af blodfortyndende medicin

Det bliver ved konsultationen før operationen aftalt hvor mange dages pause med blodfortyndende medicin du skal holde op til operationen.

Sukkersygemedicin

- Ved planlagt operation før kl. 12 skal du ikke tage insulin og anden blodsukkerregulerende medicin om morgenen på operationsdagen.
- Ved planlagt operation efter kl. 12 skal du tage insulin og anden blodsukkerregulerende medicin som vanligt om morgenen på operationsdagen.

Naltrexon

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages 3 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter operationen.

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Urologisk Klinik