

Urininkontinens hos kvinder

Urininkontinens hos kvinder

Urininkontinens betyder ufrivillig afgang af urin. Det kan dreje sig om alt fra få dråber urin til større mængder, der kan kræve bind eller ble.

Inkontinens er en meget almindelig tilstand, der ses hos op over en tredjedel af alle kvinder. Det opleves ofte invaliderende, idet det afskærer en fra at deltage i sport eller anden aktivitet, eller i andre tilfælde binder en til at være i nærheden af et toilet.

De vigtigste typer af urininkontinens er:

1. **Stress-inkontinens** Lækage i forbindelse med host, nys, løft, latter eller anden fysisk aktivitet. Dette skyldes oftest en svækkelse af bækkenbunden, som regel efter fødsler.
2. **Trang-inkontinens** Lækage i forbindelse med stærk vandladningstrang, som ikke kan undertrykkes. Dette kaldes også overaktiv blære, og er en tilstand hvor den normale kontrol over blæren er påvirket.
3. **Blandingsinkontinens** med varierende grad af begge typer

Behandlingen er forskellig, afhængig af typen af inkontinens.

Forundersøgelse

Inden du møder første gang til undersøgelse på Privathospitalet Mølhølm, bedes du udfylde to skemaer. Det ene er et spørgeskema vedrørende vandladningssymptomerne og det andet er et væske-vandladningsskema. Dette skal føres over tre døgn med registrering af hvor meget du drikker, hvornår du lader vandet, mængden af de enkelte vandladninger, samt tidspunkt for eventuelle episoder med urinlækage. Et plastiklitermål er velegnet, og målingerne foretages selvfølgelig mest praktisk en dag, hvor du er hjemme og i nærheden af dit toilet.

Forundersøgelsen omfatter en gennemgang af spørgeskemaet og evt. andre symptomer, der kan have betydning for vurdering af, om operation tilrådes. Du bedes møde med almindelig vandladningstrang til undersøgelsen, dvs. helst undgå at lade vandet de sidste to timer inden undersøgelsen. Undersøgelsen omfatter en måling af din vandladning (flowundersøgelse). Det foregår ved at du i enerum lader vandet på et specialtoilet. Desuden foretages gynækologisk

undersøgelse og en ultralydskanning af blæren. I visse tilfælde foretages også kikkertundersøgelser af blæren.

Undersøgelserne munder så ud i en beslutning om den videre udredning eller behandling.

Behandling af stressinkontinens

Man indleder behandlingen med bækkenbundstræning. Er der ikke effekt af dette efter nogle uger, kan operation overvejes.

slyngeoperation (TVT)

Bulking (injektion af tætningsmateriale omkring urinrøret).

Hvis man er efter overgangsalderen er mange blevet tilbudt lokal hormonbehandling (fx Vagifem eller Ovestin)

Behandling af trangsinkontinens

Blæretræning, medicinsk behandling eller indsprøjtning i blærevæggen med medicin (nervegift af samme type som bruges som antirykkebehandling.)

I visse tilfælde kan man foretage operation med udvidelse af blæren. Her udvides blæren i nogle timer med saltvand, mens man har en rygmarvsbedøvelse.

Læs mere

[Slyngeoperation for stressinkontinens hos kvinder \(TVT\)](#)

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Urologisk Klinik